

WEINBERG



0,5-0,8 l/ha

Besprühen Sie die Pflanzen während der Vegetationsperiode 4–7 Mal im Abstand von mindestens 10–14 Tagen. Der Verbrauch an Arbeitsflüssigkeit beträgt für jede Behandlung mindestens 300 l/ha.

1. Top-Dressing mit Beginn des Wachstums von Trieben und Blüten.
2. Top-Dressing zum Zeitpunkt des Lösens der Blüten vor Beginn der Blüte
3. Fütterung – Beginn des Beerenwachstums
4. Nahrungswachstum von Beeren
5. Fütterung – Beginn der Reifung der Beeren
6. Es wird außerdem mit allen Pestiziden und Fungiziden vermischt und nach jedem Krankheitsbefall mit 2,5–4,0 l/1000 l Wasser versprüht

Die Wurzelbehandlung umfasst eine drei- bis fünfmalige Anwendung während der Vegetationsperiode der Pflanzen. Der Verbrauch der Reliquie beträgt 4,0-9,5 l/ha.

Die wesentlichen Anwendungsschritte sind in den Vorschriften zum Aufbringen von Relikten im Spritzverfahren festgehalten.

Bei einer Erhöhung des Verbrauchs der Arbeitslösung beim Sprühen können pro weiteren 100 l/ha 0,1 l/ha Relikt bis zu 0,5 l/ha hinzugefügt werden.

Die Verwendung von Relict R durch die Wurzelfütterungsmethode beschleunigt manchmal das Fruchtwachstum, was zu Rissen führen kann. Wenn die ersten Anzeichen auftreten, ist es notwendig, die

Bewässerungsgeschwindigkeit zu ändern und die Wassermenge um 10-20 % gegenüber der üblichen zu reduzieren. Sie können den Weinberg mit diesem Präparat nicht verbrennen oder schädigen, da das Präparat keine chemischen Inhaltsstoffe enthält. Es ist jedoch besser, es gemäß den Herstellervorschriften anzuwenden.