

Bundeve: (lubenica, dinja, bundeva, ...)



0,3 – 0,4 l/t sjemena

Obrada sjemena najmanje 2 sata prije sjetve. Potrošnja radne otopine 10-20 L/t.

15 - 30 ml/ 10 - 12 l vode

Potapanje sjemena prije sjetve 6-12 sati.

0,5– 0,6 l/ha folijarno

Prskanje tijekom vegetacije 2-3 puta s razmakom od 10-14 dana između tretmana.

Glavne fenofaze: 2-3 prava lista, pupanje - početak cvatnje i razdoblje formiranja ploda (rast ploda).

2 – 2,5 l/ 1000 l vode

Zalijevanje korijena 2-4 puta tijekom vegetacije s intervalom od 10-14 dana Potrošnja radne otopine prema stopi navodnjavanja.

Glavne fenofaze na otvorenom polju: 2-3 prava lista, pupanje - početak cvatnje i peri- od formiranja ploda (rast ploda).

U zaštićenom tlu: 1. zalijevanje kod sadnje presadnica / 2. zalijevanje 14 dana nakon sadnje, prije cvatnje / 3. zalijevanje 14 dana nakon prethodnog od početka sadnje voća / 4. 10-14 dana nakon prethodnog.

Kod uzgoja biljaka u zaštićenom tlu, npr. na dinjama primjena Relikta R ubrzava rast biljaka i plodova. Povećana prehrana može dovesti do pucanja. Kada se pojave prvi znakovi, potrebno je promijeniti brzinu navodnjavanja, smanjujući količinu vode za 10-20% od uobičajene. U tom slučaju treba pažljivo pratiti kako se lišće kulture ne bi počelo previše spuštati.