

## VINOGRAD



0,5-0,8 l / ha

Prskanje biljaka tijekom vegetacije 4-7 puta s razmakom od najmanje 10-14 dana. Potrošnja radne tekućine pri svakoj obradi nije manja od 300 l / ha.

1. gornji preljev s početkom rasta izbojaka i cvatova.
2. gornji preljev u vrijeme labavljenja cvatova, prije početka cvatnje
3. hranjenje-početak rasta bobica
4. hranjenje-rast bobica
5. hranjenje-početak zrenja bobica
6. isto tako mjesta se sa svim pesticidima i fungicidima i prska poslije svakih napada bolesti 2,5-4,0 l/1000 l vode

Preljev korijena uključuje 3-5 puta upotrebu tijekom vegetacije biljaka. Stopa potrošnje relikta je 4,0-9,5 l/ha.

Glavne faze primjene zabilježene su u propisima o primjeni relikta prskanjem.

S povećanjem potrošnje radne otopine tijekom prskanja, za svakih dodatnih 100 l/ha može se dodati 0,1 l/ha relikta do 0,5 l/ha.

Korištenje relikta R metodom korijenskog hranjenja ponekad ubrzava rast plodova, što može dovesti do njihovog pucanja. Kada se pojave prvi znakovi, potrebno je promijeniti brzinu navodnjavanja, smanjujući količinu vode za 10-20% od uobičajene. Sa ovim preparatom nemožete spaliti ili nastetiti vinogradu posto preparat ne sadrži nikakvih hemijskih sastojaka no bolje ga primjeniti po reglamentu proizvođača.