

VIGNETO



0,5-0,8 l/ha

Spruzzare le piante durante la stagione di crescita 4-7 volte con un intervallo di almeno 10-14 giorni. Il consumo di fluido di lavoro per ogni trattamento non è inferiore a 300 l/ha.

1. vestirsi meglio con l'inizio della crescita di germogli e fiori.
2. la medicazione superiore al momento dell'allentamento dei fiori, prima dell'inizio della fioritura
3. alimentazione-inizio della crescita delle bacche
4. alimentazione-crescita delle bacche
5. alimentazione-inizio maturazione degli acini
6. viene inoltre miscelato con tutti i pesticidi e fungicidi e spruzzato dopo ogni attacco di malattia 2,5-4,0 l/1000 l di acqua

La medicazione per le radici prevede 3-5 utilizzi durante la stagione di crescita delle piante. Il consumo della reliquia è di 4,0-9,5 l/ha.

Le fasi principali dell'applicazione sono registrate nei regolamenti sull'applicazione dei relitti mediante spruzzatura.

Aumentando il consumo della soluzione di lavoro durante l'irrorazione, per ogni 100 l/ha aggiuntivi si possono aggiungere 0,1 l/ha di relic fino a 0,5 l/ha.

L'uso di Relict R con il metodo di alimentazione radicale a volte accelera la crescita dei frutti, che può portare alla loro rottura. Quando compaiono i primi segni, è necessario modificare la velocità dell'irrigazione, riducendo la quantità di acqua del 10-20% rispetto al solito. Non è possibile bruciare o danneggiare il vigneto con questo preparato, poiché il preparato non

contiene ingredienti chimici. ma è meglio applicarlo secondo le prescrizioni del produttore.