

Buče: (lubenica, melona, buča, ...)



0,3 – 0,4 l/t semena

Tretiranje semena vsaj 2 uri pred setvijo. Poraba delovne raztopine 10-20 L/t.

15 - 30 ml/ 10 - 12 l vode

Potopitev semen pred setvijo 6-12 ur.

0,5–0,6 l/ha foliarno

Škropljenje v rastni sezoni 2-3 krat z intervalom 10-14 dni med tretmaji.

Glavne fenofaze: 2-3 pravi listi, brstenje - začetek cvetenja in obdobje nastajanja plodov (rast plodov).

2 – 2,5 l/ 1000 l vode

Zalivanje korenin 2-4 krat v rastni sezoni z intervalom 10-14 dni. Poraba delovne raztopine glede na stopnjo namakanja.

Glavne fenofaze na prostem: 2-3 pravi listi, brstenje - začetek cvetenja in peri- od oblikovanja plodov (rast plodov).

V zaščiteneh tleh: 1. zalivanje ob sajenju sadik / 2. zalivanje 14 dni po sajenju, pred cvetenjem / 3. zalivanje 14 dni po prejšnjem od začetka sajenja plodov / 4. 10-14 dni po prejšnjem.

Pri gojenju rastlin v zaščitenih tleh, na primer na melonah, uporaba Relikta R pospeši rast rastlin in plodov. Povečana prehrana lahko povzroči razpoke. Ko se pojavijo prvi znaki, je treba spremeniti stopnjo namakanja in zmanjšati količino vode za 10-20% od običajne. V tem primeru je treba skrbno spremljati, da se listi kulture ne začnejo preveč spuščati.