

VINOGRAD



0,5-0,8 l/ha

Škropljenje rastlin v rastni sezoni 4-7 krat z intervalom najmanj 10-14 dni.
Poraba delovne tekočine za vsako obdelavo ni manjša od 300 l / ha.

1. gnojenje z začetkom rasti poganjkov in cvetov.
2. gnojenje v času sproščanja cvetov, pred začetkom cvetenja
3. hranjenje - začetek rasti jagod
4. hranjenje-rast jagod
5. hranjenje - začetek zorenja jagod
6. zmešamo z vsemi pesticidi in fungicidi ter škropimo po vsakem napadu bolezni 2,5-4,0 l/1000 l vode.

Koreninski preliv vključuje 3-5-kratno uporabo v rastni sezoni rastlin.
Poraba relikta je 4,0-9,5 l/ha.

Glavne faze nanašanja so zapisane v pravilniku o nanašanju relikto v s škropljenjem.

S povečanjem porabe delovne raztopine pri škropljenju lahko na vsakih nadaljnjih 100 l/ha dodamo 0,1 l/ha relikta do 0,5 l/ha.

Uporaba relikta R z metodo koreninskega hranjenja včasih pospeši rast plodov, kar lahko privede do njihovega razpokanja. Ko se pojavijo prvi znaki, je treba spremeniti hitrost namakanja, zmanjšati količino vode za 10-20% od običajne. S tem pripravkom ne morete opeči ali poškodovati vinograda, saj pripravek ne vsebuje nobenih kemičnih sestavin. vendar je bolje, da ga uporabite v skladu s predpisi proizvajalca.